




Neonatos y COVID 19

Dra. Natalia Restrepo Centeno
Dra. Leslie Martínez De la Barrera
Dr. Oscar Ovalle
Dra. Lida Leal



Instituto Global de
Excelencia Clínica


Medidas generales para el recién nacido con BPN o pretérmino en pandemia.

- La posición canguro , el amor, calor y LM, son componentes esenciales para el cuidado de los RNPT BPN.
- El alojamiento conjunto, la LM directa, el contacto piel a piel debe mantenerse.
- El egreso debe realizarse asegurando el seguimiento desde un PMC según lineamientos PMC vigentes.
- La Hx por inmadurez o BPN seguirán los protocolos institucionales establecidos, con los lineamientos técnicos vigentes.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD. Junio 2020.



GENERALIDADES ATENCIÓN RECIÉN NACIDO SANO - URN



- Limitar el ingreso solo de padre, madre o cuidador sano.
- La estrategia de puertas abiertas para toda la familia será interrumpida hasta el término de la pandemia.
- Todo el personal y los acompañantes deben mantener las medidas de protección por gotas y contacto.
- Al ingreso valorar riesgos de contacto, síntomas respiratorios y antecedente de fiebre en todos los padres o cuidadores que ingresan.
- Mantener una distancia de 2 metros alrededor de cada recién nacido con su cuidador.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD 2020.

SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO CANGURO

PRIMERA FASE: Consulta ambulatoria hasta las 40 semanas de edad gestacional .



- Asegurar el seguimiento durante toda la pandemia.
- Primera consulta dentro de las 48 horas después del egreso.
- Controles de acuerdo con lineamientos vigentes de PMC.
- Si el área de consulta es colectiva, debe adecuarse para que la distancia entre los pacientes que esperan sea de 2 mts.
- En consulta colectiva, el personal de salud mantener distancia física de 2 metros.
- Brindar a los padres un # de teléfono de urgencias 24 horas, 7 días a la semana.
- Llamas a padres día previo a la consulta para indagar sobre sintomatología respiratoria.
- Implementación de triage para la detección de síntomas y reprogramación de citas.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.

SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO CANGURO

SEGUNDA FASE: 40 semanas hasta 12 meses de edad corregido mínimo



- Los controles de segunda fase con todo el equipo multidisciplinario se deben reiniciar lentamente (de acuerdo con la reactivación gradual de los servicios de salud) priorizando los casos.
- Se debe realizar seguimiento por telemedicina interactiva en casos especiales y definidos.
- Consultas presenciales según los lineamientos técnicos vigentes, iniciando con los niños de más alto riesgo.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.

RECIÉN NACIDO PREMATURO O BAJO PESO AL NACER CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN PARA SARS-COV-2

- Mientras que la madre, padre o cuidador sean sospechoso para COVID-19, NO pueden ingresar a la URN, hasta terminar aislamiento y cumplir criterios de curación INS
- Un familiar asintomático y sin contacto previo con casos, puede reemplazar a los padres, durante estos 14 días y lo traslade para la alimentación cada 2 horas y asista a la consulta con él RN.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.

VACUNACIÓN DEL RECIÉN NACIDO



- En caso de madre positiva para Coronavirus, se difiere la aplicación de las vacunas del RN 28 días, previa verificación del estado de salud del RN.
- En madre con estado desconocido para Hepatitis B o madre (+) para Hepatitis B con sospecha o confirmación para COVID-19, aplicar la vacuna de Hepatitis B e Ig al RN en las primeras 12 horas.
- La indicación de inmunización con Palivizumab es la misma que en pacientes pretérmino previo a la pandemia por COVID-19.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS



Las pruebas diagnósticas usadas en neonatos son las mismas que las usadas en la población pediátrica



A todos los hijos de mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19 se les debe descartar la infección por COVID-19


Se debe realizar PCR-RT entre 24 a 48 horas después del parto.



Si la prueba molecular es negativa y si tiene alta sospecha de SARS- CoV 2, se debe repetir la prueba molecular RT- PCR 48 a 72 horas.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.


Mensajes para madres y familias



No se ha demostrado que el coronavirus (COVID-19) sea transmitido por la madre a su hijo durante la gestación o nacimiento



No se ha demostrado presencia del virus en la leche materna.



No se ha demostrado que un recién nacido pueda contagiarse por COVID-19 por medio del contacto piel con piel o el alojamiento conjunto.



La forma de contagio se da por gotas respiratorias (tos, estornudos)



El riesgo de contagio disminuye con la práctica de medidas de higiene y prevención del contagio.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.

Mensajes para madres y familias



La LM y el contacto piel con piel, tiene muchos beneficios para la madre y el niño, que superan los riesgos de transmisión.



Prefiera siempre alimentar al bebé con LM y no con fórmulas lácteas.



Reduzca el número de cuidadores al mínimo y que cumplan con medidas de higiene y prevención.



De acuerdo con su estado de salud, cuenta con opciones para el cuidado de su bebé.



Cualquiera sea su decisión, el personal de salud le apoyará y orientará.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.



Medidas de higiene y prevención del contagio



Lavado de manos frecuente durante 40 a 60 segundos antes de tocar al bebé o extraerse la leche.

Usar permanentemente mascarilla quirúrgica estándar (cubriendo completamente nariz y boca).



Evitar hablar o toser especialmente durante el amamantamiento o extracción de la leche.



Si tose o estornuda sobre los pechos, lavar con agua tibia y jabón secando con tela suave antes de amamantar o extraer la leche.

Mantener las medidas de desinfección rutinaria de las superficies con las que entre en contacto.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.

Medidas de bioseguridad para los profesionales



Lavado de manos cumpliendo los 5 momentos OMS.

Vestir EPP (mascarilla quirúrgica, gafas, bata y uso de guantes si hay exposición a fluidos corporales).



Usar guantes y mascarilla N95 si se va a realizar un procedimiento que genere aerosoles.


Contar con kit de EPP , en caso de reanimación en urgencia en el PMC.



Desinfección de los equipos utilizados entre cada paciente con toallas desechable humidificada con antiséptico (alcohol a 70%).

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.

Medidas de bioseguridad para los profesionales



Desinfección regular de las mesas y sillas en el PMC durante el día con antiséptico pulverizado.

La mesa de consulta debe estar forrada con un plástico lo que permite una desinfección con antiséptico después de cada paciente.



Deben asistir en ropa de calle y cambiarse a la entrada de la unidad o del PMC. El ideal es cambiarse de ropa y de uniforme todos los días.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.



Red Global de Gestión y Transferencia
de Conocimiento

Las madres y los recién nacidos en el mundo no tienen mucho más tiempo para esperar, ¡ahora es el momento!

Dr Augusto Sola.

Fuente: Presentación Actualización de lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. MINSALUD, junio-2020.